

Calcium Bovisal

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

OBBIETTIVO

- 1 PREVENIRE L'IPOCALCEMIA
- 2 COMPENSARE L'IPOCALCEMIA INIZIALE
- 3 FORNIRE ENERGIA

MODO D'USO

1 FLACONE ENTRO 6 ORE DAL PARTO, PRIMA DEL COLOSTRO MATERNO. IN ASSENZA TOTALE DI COLOSTRO, SOMMINISTRARE PER VIA ORALE 1 FLACONE SUBITO DOPO IL PARTO, 1 FLACONE 12 ORE DOPO IL PARTO E 1 FLACONE 24 ORE DOPO IL PARTO

COMPOSIZIONE

50 GRAMMI DI CALCIO + 3,1 MJ DI ENERGIA



Bovisal Pearls

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

OBBIETTIVO


- 1 PREVENIRE L'IPOCALCEMIA
- 2 COMPENSARE L'IPOCALCEMIA INIZIALE
- 3 COMPENSARE L'IPOFOSFATEMIA INIZIALE

MODO D'USO

SOMMINISTRARE PER VIA ORALE 1 FLACONE SUBITO DOPO IL PARTO E 1 FLACONE 12 ORE DOPO IL PARTO. 5 GIORNI

COMPOSIZIONE

56 G DI CALCIO, 11 G DI FOSFORO E 2,5 MJ DI ENERGIA.



Phosphor Bovisal

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

OBBIETTIVO

- 1 STIMOLARE L'APPETITO DOPO IL PARTO
- 2 PREVENIRE LA SINDROME DELLA VACCA A TERRA
- 3 EVITARE IL DECUBITO PROLUNGATO

MODO D'USO

SOMMINISTRARE 1 FLACONE IN CASO DI INAPPETENZA POST-PARTO O PARESI PUERPERALE. RIPETERE OGNI 8 - 10 ORE SECONDO NECESSITÀ.

COMPOSIZIONE

51 G DI FOSFORO E 50 G DI CALCIO.



Keto Bovisal

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

OBBIETTIVO

- 1 COMPENSARE LA CHETOSI
- 2 PREVENIRE LA STEATOSI
- 3 RIDURRE IL LAVORO
- 4 ABBREVIARE LA MALATTIA

MODO D'USO

1 FLACONE. RIPETERE A INTERVALLI DI 12 ORE FINO ALLA SCOMPARSA DEI SINTOMI (BHBA ELEVATO, SCARSO APPETITO, RIDOTTE PRODUZIONI, ECC.)

COMPOSIZIONE

8 G DI NIACINA, 2 G DI CARNITINA + VITAMINE, MINERALI E 3,0 MJ DI ENERGIA.



Rumen Bovisal

COMPENSA L'IPOCALCEMIA

OBBIETTIVO

- 1 CORREGGERE L'ACIDOSI
- 2 STABILIZZARE LA MICROFLORA
- 3 STIMOLARE L'APPETITO

MODO D'USO

1 FLACONE. RIPETERE ENTRO 12 ORE. SE NECESSARIO, RIPETERE OGNI 12 ORE FINO A RISTABILIRE LA FUNZIONE RUMINALE

COMPOSIZIONE

TAMPONI, PREBIOTICI, VITAMINE, MINERALI E 3,0 MJ DI ENERGIA.

